



SEMESTRAL

UNI

academiacesarvallejo.edu.pe

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

SEMESTRAL
UNI





FÍSICA

Tema: ONDAS
ELECTROMAGNÉTICAS



Objetivos


- ☐ Conocer la generación y características de las ondas electromagnéticas.
- ☐ conocer las ecuaciones de la rapidez de la onda electromagnética y las respectivas funciones de onda.
- ☐ Conocer las distintas ondas electromagnéticas ordenadas en el espectro electromagnético.



GENERACIÓN DE UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA

Un campo eléctrico variable en el tiempo induce, en torno suyo, un campo magnético variable en el tiempo, este último induce, en torno suyo, un campo eléctrico variable y así sucesivamente.



A esta concatenación de campos eléctrico y magnéticos variables, que avanza en el espacio, se denomina **onda electromagnética (OEM)**




El físico-matemático escocés James Clerk Maxwell (1831–1879) sistematizó todas las leyes de la electricidad y el magnetismo en 4 leyes y surgió de ese análisis la existencia de las OEM (1865). 20 años después el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz demostró experimentalmente la existencia de las OEM.



También las OEM se generan debido a la aceleración que experimentan las partículas electrizadas ya que estas partículas al tener una aceleración perturban el campo eléctrico variando su intensidad en el tiempo lo cual genera campos magnéticos también variables en el tiempo y estos a su vez generan campos eléctricos y así sucesivamente, es decir producen una OEM.



En una antena transmisora se generan OEM haciendo oscilar electrones.



Características de una OEM

En el vacío las OEM se propagan con la rapidez de la luz (c).

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

ϵ_0 : permitividad dieléctrica del vacío

μ_0 : permeabilidad magnética del vacío

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

En otros medios, la rapidez es menor a c y depende de las propiedades eléctricas y magnéticas del medio, tal que:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}}$$


ϵ_r : permitividad eléctrica relativa del medio

μ_r : permeabilidad magnética relativa del medio

$$\epsilon_{vacío} = 1$$

$$\mu_{vacío} = 1$$

- Los campos eléctrico y magnético oscilan con la misma frecuencia y son mutuamente perpendiculares.



Para cualquier instante de tiempo se cumple:

$$v_{OEM} = \frac{E}{B}$$

Además:

$$v_{OEM} = \lambda f$$

Los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ se describen mediante las siguientes ecuaciones:

$$\vec{E} = E_{m\acute{a}x} \text{sen}(\omega t \pm kx)$$

$$\vec{B} = B_{m\acute{a}x} \text{sen}(\omega t \pm kx)$$

APLICACIÓN

Una onda electromagnética se propaga en el vacío y pasa a otro medio donde su rapidez de propagación es del 60 % respecto al vacío. Si en dicho medio $\mu_r = 1$; determine su ϵ_r .

RESOLUCIÓN

APLICACIÓN

Las OEM de una emisora radial tienen una frecuencia $2 \times 10^8 \text{ Hz}$ y un valor máximo del campo eléctrico de 600 N/C . Determine su longitud de onda y el valor máximo del campo magnético.

RESOLUCIÓN


APLICACIÓN

La intensidad de campo eléctrico de una onda electromagnética está dada por

$$\vec{E} = 200 \text{sen}(10^{13} \pi t - 5\pi \times 10^5 x) \hat{j} \text{ N/C}$$

Donde x está en metros y t en segundos.


Determine la rapidez de la onda .





RESOLUCIÓN

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

El espectro electromagnético es el conjunto de frecuencias y longitudes de onda que abarca cada tipo de onda electromagnética.



La luz es una parte del espectro electromagnético



APLICACIÓN

Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones.

- I. Sabiendo que la radiación visible esta en el rango de $4,3 \times 10^{14} \text{ Hz}$ y $7,5 \times 10^{14} \text{ Hz}$, una onda de 630 nm de longitud de onda en el vacío está comprendida en el espectro visible.
- II. Las microondas tienen mayor frecuencia que los rayos X en el espectro electromagnético.
- III. Una antena de una radioemisora emite normalmente radiación ultravioleta o infrarroja.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| A) VFF | B) FVF | C) FFV |
| D) VVF | | E) FFF |

RESOLUCIÓN

— ACADEMIA —

CÉSAR

VALLEJO

GRACIAS

SÍGUENOS:   

academiacesarvallejo.edu.pe